

상세 정보

간염 치료 방법

간의 손상은 언제든지 발생할 수 있으니 만성 B형 간염 환자는 정기적으로 의사를 만나서 간의 건강을 지켜보십시오.

B형 간염 바이러스를 억제할 수 있는 치료제는 있습니다. 치료제는 간의 손상 혹은 간암 발생률을 감소시킬 수 있습니다. 약물치료가 필요하면 의사와 상의하여 치료해야 합니다.

간염 예방접종

B형 간염의 최고 예방 방법은 예방접종을 받는 것입니다. 예방접종을 맞은 후에는 B형 간염 바이러스가 감염되지 않습니다.


호주에서는 신생아, 유아, 어린이, 청소년 및 B형 간염 보균자와 함께 생활하는 가족 및 타인은 무료 B형 간염 예방주사를 받을 수 있습니다.


B형 간염 예방주사는 의사에게 문의하십시오.


정보 및 지원 안내:

Multicultural HIV and Hepatitis Service (다문화 HIV 및 간염 서비스)

한국어 상세 문의


 www.mhahs.org.au


 info@mhahs.org.au

 TheMHAHS

Hepatitis NSW (NSW 간염 협회)


Hepatitis Infoline (간염 전화)

 www.hepb.org.au

 1800 803 990

Hepatitis Australia (호주 간염 협회)


전국 안내 전화

 www.hepatitisaustralia.com

 1300 437 222

Translating and Interpreting Service (TIS) (번역 및 통역 서비스)

한국어 통역사 연결은 아래 전화번호를 이용하시면 됩니다


 131 450

www.mhahs.org.au/index.php/ko/hepatitis/hepatitis-b-testing

2019

B형 간염

당신도 B형 간염의 감염자일 수 있습니다.
문의하시고 검사 받으세요.



B형 간염

검사 받으십시오.

B형 간염이란 무엇인가?

B형 간염은 B형 간염 바이러스에 의해 간에 발생한 감염입니다.

‘간염’이라는 말은 간의 염증을 뜻합니다. 간이 손상되거나 염증이 생기면 간의 기능이 떨어지고 건강상 문제를 초래할 수 있습니다.

간염은 급성 (단기) 혹은 만성으로 (장기) 구분됩니다.

급성 B형 간염은 사람이 6개월 이내에 바이러스를 제거 (클리어) 할 때입니다. 치료가 끝나면 B형 간염 바이러스에 다시 감염 될 수 없으며 전염 시킬 수 없습니다.


만성 B형 간염은 간의 염증이 6개월 이상 지속되는 상태를 말합니다. 만성 B형 간염은 간을 손상시켜 간경변(증)이나 간암으로 진행될 수도 있습니다.

병이 진행된 몇 년 후 증상이 나타날 수 있어 대부분의 만성 B형 간염을 가지고 있는 사람들은 자신이 B형 간염을 가지고 있다는 것을 모르는 경우가 많습니다.

건강한 간



손상된 간




당신도 B형 간염의 감염자일 수 있습니다

B형 간염은 우리 지역 사회에서도 많이 볼 수 있습니다.

호주에서 만성 B형 간염 환자 대부분은 B형 간염이 매우 흔한 국가에서 태어난 이민자들입니다.

세계 B형 간염 분포



B형 간염에 걸리는 사람의 나이가 어릴 수록, 성인이 되어서 만성 B형 간염이 될 위험이 더 높아집니다. 가장 일반적인 감염 경로는 다음과 같습니다:

- 출생시 감염자인 산모로부터 신생아에게 전염.
- 아동기에, 아물지 않거나, 붕대를 감지 않은 상처를 통해 다른 아이들에게 전염.

B형 간염에 걸린 아기들의 90%가 만성 간염에 걸리게 됩니다.

검사 받으십시오

만성 B형 간염에 걸렸는지 알아보는 유일한 방법은 정확한 혈액 검사를 하는 것입니다. 이것은 신속하고 쉬운 방법입니다.

다음과 같은 경우에는 의사에게 B형 간염 검사를 의뢰하십시오:

- B형 간염이 흔히 발생하는 나라에서 출생 혹은 거주한 사람.
- 가족 중에 B형 간염, 간질환 또는 간암 환자가 있는 사람.
- 만성 B형 감염자와 거주 하는 사람.
- 피임 기구를 사용하지 않고 성관계를 한적이 있는 경우 (콘돔을 사용하지 않고 성관계 한 경우).
- 의료기구 멸균이 (소독) 적절하게 이루어지지 않은 나라에서 의료 및 치과 시술을 했던 사람.
- 혈액에 노출될 수 있는 문신, 피어싱 혹은 침과 같은 문화적 관습에 참여한 사람.
- 해외에서 또는 1990년 이전에 호주내에서 수혈한 경험이 있는 경우.

